

matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej
lista 4

1. Korzystając z tablic trwania życia wyznacz prawdopodobieństwa następujących zdarzeń
 - (a) (20) przeżyje jeszcze co najmniej rok;
 - (b) dożyje 3 roku życia;
 - (c) (90) dożyje 100 lat;
 - (d) (15) przeżyje jeszcze co najmniej 50 lat;
 - (e) (50) przeżyje dokładnie 2 lata (umrze pomiędzy 52 a 53 rokiem życia);
 - (f) (30) nie dożyje 31 urodzin;
 - (g) (80) przeżyje dokładnie 5 lat;
 - (h) (15) umrze w wieku 30 lat;
 - (i) (35) nie dożyje 45 urodzin;
 - (j) (65) umrze przed osiągnięciem 70 roku życia.
2. Niech $X \sim U[0, \omega]$ oraz $l_0 = 100000$, obliczyć l_x oraz d_x dla $x = 1, \dots, \omega$.
3. Mając dane $l_x = (115 - x)^{\frac{1}{2}}$ dla $0 \leq x \leq 115$ obliczyć prawdopodobieństwo, że osoba w wieku 34 lat umrze między 66 a 79 rokiem życia.
4. Korzystając tylko z wartości umieszczonych w tablicy życia w kolumnie p_x wyznacz prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrany
 - a) (15) przeżyje co najmniej 3 lata;
 - b) (20) przeżyje co najmniej 2 lata;
 - c) (12) nie dożyje 14 roku życia;
 - d) (70) nie dożyje 74 urodzin;
 - e) noworodek nie dożyje wieku 5 lat.
5. Niech X będzie zmienna losową o dystrybucji
$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$
 - a) obliczyć ilość zgonów pomiędzy 45 a 50 rokiem życia przyjmując $l_0 = 100000$;
 - b) pokazać, że $q_x = q_{x+1} = q_{x+2} = \dots$
6. Znaleźć l_x , jeśli $l_0 = 1000$ oraz $\mu_t = at$.
7. Dla populacji ($l_0 = 100000$) noworodków w której $s(10) = 0,971$, ${}_{15}p_{10} = 0,986$ oraz ${}_{10}p_{15} = 0,990$ obliczyć
 - a) oczekiwaną liczbę osób, które dożyją wieku 25 lat;
 - b) oczekiwaną liczbę zgonów pomiędzy wiekiem 10 a 15 lat;
 - c) prawdopodobieństwo, że (10) umrze pomiędzy 15 a 25 rokiem życia.
8. Jakim funduszem trzeba dysponować w chwili obecnej, aby obiecać grupie 1000 osób w wieku 35 lat płatności w wysokości 1j.p., które zostaną dokonane za 20 lat tym osobom, które dożyją 55 roku życia? Założyć stopę procentową w wysokości $i = 5\%$.