

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

9.10.2010

ogólna definicja prawdopodobieństwa, własności

1. Niech $\Omega = [0, 1]$ oraz niech Σ będzie pewną σ -algebrą podzbiorów odcinka $[0, 1]$. Udowodnić, że funkcja

$$P(A) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } \frac{1}{2} \in A \\ 0 & \text{gdy } \frac{1}{2} \notin A \end{cases}$$

określona na zbiorach $A \in \Sigma$ spełnia aksjomaty prawdopodobieństwa.

2. Pokazać, że jeśli $P(A) = 0,7$ i $P(B) = 0,8$, to $P(A \cap B) \geq 0,5$.
3. Zdarzenia A i B są rozłączne oraz $A \cup B = \Omega$. Wiedząc, że $P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{16}$, oblicz $P(A)$ i $P(B)$.
4. Czy prawdą jest, że w dowolnej przestrzeni probabilistycznej (Ω, Σ, P) dla dowolnego $A \in \Sigma$ zachodzi równoważność

$$P(A) = 0 \iff A = \emptyset.$$

5. **(d)** Dane są $P(A') = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ i $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$. Obliczyć $P(B')$, $P(A \cap B')$ i $P(B \setminus A)$.
6. **(d)** Dane są $P(A' \cap B') = \frac{1}{2}$, $P(A') = \frac{2}{3}$, ponadto $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Obliczyć $P(B)$ i $P(A' \cap B)$.
7. Niech $\Omega = \{\omega_n, n = 1, 2, \dots\}$, $\Sigma = 2^\Omega$. Weźmy ciąg $p_n = c3^{-n}$, $n = 1, 2, \dots$. Dobrać stałą c tak, aby ciąg (p_n) określał prawdopodobieństwo P na Σ tak, że $P(\{\omega_n\}) = p_n$. Obliczyć $P(\{\omega_3, \dots, \omega_9\})$.

klasyczna definicja prawdopodobieństwa

8. Rzucamy 3 razy monetą. Opisać przestrzeń probabilistyczną odpowiadającą temu doświadczeniu (co to są Ω, Σ, P ?).
9. Dziesięć książek ustawiono losowo na jednej półce. Obliczyć prawdopodobieństwo, że trzy określone książki znajdują się obok siebie.
10. **(d)** Cyfry $0, 1, 2, \dots, 9$ ustawiono losowo. Jakie jest prawdopodobieństwo, że
- a) między 0 i 1 znajdują się dokładnie cztery cyfry?
 - b) 7, 8 i 9 będą stały obok siebie?
11. Mamy $2n$ kartek ponumerowanych liczbami od 1 do $2n$ oraz $2n$ podobnie ponumerowanych kopert. Wkładamy losowo po jednej kartce do każdej koperty. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że suma liczby na kopercie i na znajdującej się w niej kartce jest dla każdej koperty parzysta?
12. Mamy pięć odcinków, których długości równe są odpowiednio 1,3,5,7,9. Obliczyć prawdopodobieństwo, że z trzech odcinków wziętych losowo można zbudować trójkąt.
13. Obliczyć prawdopodobieństwo, że dwa losowo wybrane wierzchołki sześcianu jednostkowego będą odległe o więcej niż 1.
14. Z talii 52 kart losujemy 7 kart bez zwracania. Obliczyć prawdopodobieństwo, że
- a) dokładnie trzy karty będą pikami;
 - b) co najmniej dwie karty będą kierami;
 - c) **(d)** co najwyżej pięć kart będzie treflami;
 - d) **(d)** dwie karty będą kierami, trzy treflami, jedna - karo i jedna - pik.
15. Z 52 kart wylosowano 6. Jaka jest szansa, że wśród wylosowanych kart będą karty czerwone i czarne?
16. Ze zbioru X , gdzie $X = \{1, \dots, n\}$, ($n \geq 2$), losujemy kolejno dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że pierwsza z wylosowanych liczb jest większa od drugiej.
17. Ze zbioru liczb od 1 do 10 wybieramy kolejno dwie (bez zwracania) i od pierwszej odejmujemy drugą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich różnica będzie większa od 2.

18. W zbiorze $2n$ osób ($n \geq 1$) wyróżniono dwie. Czy bardziej prawdopodobne jest, że siadając losowo wokół stołu przy którym jest $2n$ miejsc, wyróżnione osoby znajdą się obok siebie, czy na przeciw?
19. Rok liczy 365 dni. Obliczyć prawdopodobieństwo, że 3 losowo wybrane panie
- urodziły się tego samego dnia;
 - pierwsza w styczniu, druga w marcu, trzecia w drugim półroczu.
20. Obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania sumy 10 oczek przy równoczesnym rzucie trzema kostkami.
21. (d) Rzucamy dwiema kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że
- suma wyrzuconych oczek jest liczbą parzystą;
 - iloczyn wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą.
22. Rzucamy n kostkami do gry. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że na wszystkich kostkach wypadła ta sama liczba oczek.
23. (d) Rzucamy dwunastoma kostkami do gry. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy każdą ściankę dwukrotnie.
24. Pięć zesztów wrzucamy do trzech szuflad. Co jest bardziej prawdopodobne
- w pewnej szufladzie będą co najmniej trzy zeszyty;
 - co najmniej jedna szuflada będzie pusta?
25. W n rozróżnialnych komórkach rozmieszczono losowo r nierozróżnialnych cząstek, zakładamy, że wszystkie możliwe rozmieszczenia są jednakowo prawdopodobne. Obliczyć prawdopodobieństwo, że
- ustalona komórka zawiera dokładnie k cząstek ($k < r$);
 - dokładnie m komórek zostało pustych ($m < n$);
 - w każdej komórce są co najmniej dwie cząstki ($r \geq 2n$).
26. (problem roztargnionej sekretarki) Do n zaadresowanych kopert włożono w sposób losowy n listów do różnych adresatów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że żaden z dwóch ustalonych adresatów nie dostanie właściwego listu.
27. (problem roztargnionej sekretarki jeszcze raz) Do n zaadresowanych kopert włożono w sposób losowy n listów do różnych adresatów. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że chociaż jeden list trafi do właściwej koperty. Wyznaczyć granicę tego prawdopodobieństwa gdy $n \rightarrow \infty$.

prawdopodobieństwo geometryczne

28. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana z odcinka $[0, 2\pi]$ liczba x należy do dziedziny funkcji
- $f(x) = \log \sqrt{\cos x - 1}$;
 - $g(x) = \log \sqrt{\cos x}$.
29. (d) Na odcinku $[0, 1]$ umieszczono losowo dwa punkty A i B. Jakie jest prawdopodobieństwo, że środek odcinka AB należy do odcinka $[0, \frac{1}{3}]$?
30. Na odcinku o długości l wybrano losowo dwa punkty. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że odległość między nimi jest mniejsza niż k , gdzie $0 < k < l$?
31. Z odcinka $[-1, 1]$ wybieramy losowo dwie liczby p i q . Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że równanie kwadratowe $x^2 + px + q = 0$ ma dwa pierwiastki rzeczywiste.
32. Odcinek długości 1 dzielimy losowo na trzy części. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że z tak uzyskanych odcinków można zbudować trójkąt?
33. (d) Na nieskończonej szachownicy o boku kwadratu równym a rzucamy monetę o średnicy $2r < a$. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że moneta przetnie co najwyżej jeden bok kwadratu.
34. Na nieskończonej płaszczyźnie poliniowanej liniami równoległymi w odległości l rzucamy losowo igłę o długości $2r, 2r < l$. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że igła dotknie jednej z prostych.

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

24.10.2010

prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa

35. Rzucamy trzema kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na żadnej kostce nie wypadła szóstka, jeśli na każdej kostce wypadła inna liczba oczek?
36. (d) Doświadczenie polega na rzucie dwiema kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadła szóstka jeśli wiemy, że suma oczek jest równa co najmniej 10?
37. Z urny zawierającej 7 kul białych i 3 czarne wyciągnięto losowo 3 kule. Jeśli wiadomo, że wśród wylosowanych kul jest kula czarna, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pozostałe dwie są białe?
38. W urnie są trzy kule białe i dwie czarne. Wyciągnięto jedną kulę z urny i wyrzucono bez oglądania, a potem wyciągnięto następną. Jaka jest szansa, że za drugim razem wyciągnięto kulę białą?
39. Wśród 65 monet jest jedna z dwoma orłami. Na wybranej losowo monecie wypadł orzeł sześć razy z rzędu. Jaka jest szansa, że była to moneta z dwoma orłami?
40. (d) Wybieramy losowo jeden ze zbiorów $A = \{1, 2, \dots, 62\}$ lub $B = \{1, 2, \dots, 124\}$. Z wybranego zbioru losujemy liczbę x . Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że liczba $x^2 + 1$ jest podzielna przez 10.
41. Na strzelnicy jest dwóch strzelców. Pierwszy z nich trafia z prawdopodobieństwem 0,5, drugi 0,8. Rzucili monetę, by ustalić, który z nich odda strzał. Postronny obserwator, który może oglądać wyniki, ale nie widzi strzelców, zaobserwował, że oddany strzał był celny. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że strzelał pierwszy strzelec?
42. Urna zawiera n kul białych i m kul czarnych. Losujemy jedną kulę, a następnie wrzucamy ją ponownie do urny dorzucając dodatkowo k kul białych, jeśli była to kula biała lub k kul czarnych, jeśli była czarna. Obliczyć prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuli białej z tak uzupełnionej urny.
43. Wojtek miał w portfelu monety: N złotych i M pięćzłotówek, ale zgubił jedną monetę i nie wie o jakim nominale. Wyciągnięte losowo z portfela dwie monety okazały się złotówkami. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zgubiona moneta była złotówką.
44. (d) Pewna choroba występuje w 0,2% ogółu ludności. Przygotowano test do jej wykrycia. Test daje wynik pozytywny u 97% chorych i 1% zdrowych. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana osoba jest chora, jeśli test tej osoby dał wynik pozytywny.

zdarzenia niezależne

45. Pokazać, że wylosowanie z talii 52 kart asa i wylosowanie karty czerwonej są zdarzeniami niezależnymi.
46. A, B są niezależne i $A \cup B = \Omega$. Wykazać, że $P(A) = 1$ lub $P(B) = 1$.
47. Załóżmy, że jeśli $P(A) > 0$ i $P(B) > 0$. Udowodnić, że
 - a) jeśli A i B są rozłączne, to nie są niezależne;
 - b) jeśli A i B są niezależne, to nie są rozłączne.
48. Rzucamy trzy razy kostką do gry. Zdarzenie A polega na tym, że w pierwszym i drugim rzucie wypadła ta sama liczba oczek; zdarzenie B - ta samaliczba oczek wypadła w drugim i trzecim rzucie; C - w pierwszym i trzecim rzucie. Czy zdarzenia A, B i C są niezależne? Czy są parami niezależne?
49. Adam, Bolek i Czesio rzucają po kolei monetą. Wygrywa ten, który pierwszy wyrzuci orła. Znaleźć szanse wygranej dla każdego z graczy.

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

7.11.2010

50. (d) Niech zdarzenia A, B są niezależne. Udowodnić, że są niezależne następujące zdarzenia

- A, B' ;
- A', B ;
- A, \emptyset ;
- A, Ω ;
- $A, B \cup C$ jeśli $B \cap C = \emptyset$, A i C są niezależne;
- A', B' .

schemat Bernoulliego, uogólniony schemat Bernoulliego

51. Rzucono 10 razy kostką. Jaka jest szansa otrzymania:

- 6 oczek co najmniej raz?
- parzystej liczby oczek dokładnie 3 razy?

52. (d) Rzucono 10 razy symetryczną kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w pierwszym rzucie otrzymano szóstkę, jeśli wiadomo, że otrzymano 3 szóstki?

53. Obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania parzystej liczby sukcesów w ciągu n prób Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu w pojedynczej próbie równym p .

54. Rzucamy 3 razy monetą, na której orzeł wypada

- z prawdopodobieństwem $\frac{1}{3}$,
- z prawdopodobieństwem $\frac{1}{4}$.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba wyrzuconych orłów?

55. Rzucono 100 razy kostką do gry. Jaka jest najbardziej prawdopodobna ilość wyrzuconych piątek?

56. Przeprowadzono serię doświadczeń według schematu Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu w każdym doświadczeniu równym p . Obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania r -tego sukcesu dokładnie w $(k + r)$ -tym doświadczeniu, $k = 0, 1, 2, \dots$

57. (d) Z odcinka $[0, 1]$ wylosowano 10 punktów, obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że dokładnie trzy spośród wylosowanych punktów należą do odcinka $(\frac{1}{5}, \frac{2}{5})$, oraz dokładnie cztery należą do odcinka $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$.

58. W urnie mamy N kul, wśród których M_1 jest białych, M_2 czarnych, M_3 zielonych i M_4 niebieskich ($M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = N$). Losujemy n razy po jednej kuli zwracając za każdym razem kulę do urny. Obliczyć prawdopodobieństwo, że w n losowaniach otrzymamy k_1 kul białych, k_2 kul czarnych, k_3 kul zielonych i k_4 kul niebieskich, przy czym $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = n$.

59. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pan Kowalski nie trafi szóstki grając przez rok dwa razy w tygodniu w totolotka (typując 6 liczb z 49)?

zmiennie losowe

60. Rzucamy dwiema kostkami. Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe sumie wyrzuconych oczek. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X . Znaleźć i narysować dystrybuantę zmiennej losowej X . Obliczyć $P(X > 10)$.

61. Gracz wyciąga z talii (52 kart) trzy karty (bez zwracania). Jeśli są to trzy asy, wygrywa 100 zł. Jeśli są wśród nich dokładnie dwa asy, gracz wygrywa 50 zł. Jeśli są to trzy figury, gracz wygrywa 10 zł, a w pozostałych przypadkach płaci 1 zł. Niech X oznacza wygraną gracza (przy czym przegrana 1 zł, to inaczej wygrana -1 zł). Znaleźć i narysować dystrybuantę zmiennej losowej X . Obliczyć $P(X > 0)$.

62. Rzucamy pięcioma symetrycznymi monetami. Zmienna losowa przyjmuje wartości równe ilości wyrzuconych orłów. Podać rozkład zmiennej losowej.
63. W urnie mamy 2 kule białe i 3 czarne. Losujemy po jednej kuli (za każdym razem zwracając wylosowaną kulę do urny) tak długo aż pojawi się kula biała. Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe ilości losowań. Wyznaczyć rozkład tej zmiennej losowej.
64. (d) Z sześcianu o krawędzi a wylosowano trzy wierzchołki. Zmienna losowa przyjmuje wartości równe polu trójkąta utworzonego z tych wierzchołków. Obliczyć rozkład zmiennej losowej.
65. Losujemy n - krotnie (ze zwracaniem) liczbę spośród liczb od 1 do N . X największa spośród liczb uzyskanych w losowaniu. Obliczyć rozkład zmiennej losowej.
66. Z kwadratu o boku a losowany jest punkt. Wartością zmiennej losowej X jest odległość od najbliższego boku. Wyznaczyć rozkład X .
67. Z koła o promieniu r losowany jest punkt. Zmienna losowa X przyjmuje wartość równą odległości tego punktu od środka koła. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X .
68. Dany jest odcinek $\langle 0, L \rangle$ i punkt r należący do tego odcinka. Z odcinka losujemy dwa punkty x_1, x_2 . Zmienna losowa X przyjmuje wartość 1, gdy punkt r znajduje się między wylosowanymi punktami oraz 0 w przeciwnym wypadku. Podać rozkład X .

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

21.11.2010

zmienne losowe cd.

69. Czy można dobrać stałe a, b tak aby funkcja $F(x) = a \arctan x + b$ była dystrybuantą pewnego rozkładu? Jeśli tak, to je podać wraz z uzasadnieniem.

70. Dana jest gęstość określona wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \\ 0 & x \notin \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \end{cases}.$$

Nie licząc całki podać ile wynosi prawdopodobieństwo w punkcie $\frac{\pi}{4}$. Odpowiedź uzasadnij.

71. Czy można dobrać parametr a tak, aby podane funkcje były gęstościami pewnego rozkładu zmiennej losowej? Odpowiedź uzasadnij. W przypadku odpowiedzi pozytywnej policzyć ich dystrybuanty.

a) $f(x) = \begin{cases} ax & \text{dla } x \in \langle 0, 4 \rangle \\ 0 & \text{dla } x \notin \langle 0, 4 \rangle \end{cases};$

b) $f(x) = \begin{cases} ax & \text{dla } x \in \langle -1, 4 \rangle \\ 0 & \text{dla } x \notin \langle -1, 4 \rangle \end{cases};$

c) **(d)** $f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{dla } x \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0 & \text{dla } x \notin \langle 0, 3 \rangle \end{cases};$

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x \cdot (2-x) & \text{dla } x \in \langle 0, a \rangle \\ 0 & \text{dla } x \notin \langle 0, a \rangle \end{cases};$

72. **(d)** Dobrać tak stałą c , by funkcja

$$f(x) = \begin{cases} c \sin x & \text{dla } x \in [0, \pi], \\ 0 & \text{dla } x \notin [0, \pi] \end{cases}$$

była gęstością, a następnie: a) wyznaczyć jej dystrybuantę, b) obliczyć $P(|X| < \frac{1}{3}\pi)$ i zinterpretować za pomocą wykresu gęstości i dystrybuanty.

73. Dobrać tak stałą c , by funkcja

$$f(x) = \begin{cases} c||x| - 1| & \text{dla } x \in [-1, 1], \\ 0 & \text{dla } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

była gęstością zmiennej losowej X , a następnie: a) wyznaczyć jej dystrybuantę, b) obliczyć $P(|X| < \frac{1}{3})$ i zinterpretować za pomocą wykresu gęstości i dystrybuanty.

74. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{dla } x \geq 0, \\ 0 & \text{dla } x < 0. \end{cases}$$

Wyznaczyć jej dystrybuantę oraz obliczyć $P(X \geq 2)$.

75. Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku $[-2, 5]$ ($X \sim U[-2, 5]$). Oblicz $P(X \geq 0)$.

76. Funkcje $f_i, i = 1, 2, 3$ są gęstościami rozkładów jednostajnych na odcinkach $(i-1, i)$. Wtedy są gęstościami także funkcje (odpowiedzieć *tak* lub *nie*):

a) $f_1 + f_2 + f_3,$

b) $f_2 \cdot f_3,$

c) $|f_3 - f_1|,$

d) $\frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2,$

e) $\max(f_1, f_2).$

77. Zmienna losowa ma rozkład $N(0,1)$. Oblicz prawdopodobieństwo

• $P(\{X > 0\})$

- $P(\{X > 2\})$
- $P(\{|X| < 1\})$
- $P(\{|X| > 1\})$
- $P(\{0 < X < 3\})$
- **(d)** $P(\{-1 < X < 3\})$

78. Zmienna losowa ma rozkład $N(1,2)$. Oblicz prawdopodobieństwo

- $P(\{|X| > 3\})$
- **(d)** $P(\{X^2 \leq \frac{3}{4} + X\})$

79. **(d)** Waga osoby w pewnej grupie osób opisana jest (w kg) rozkładem normalnym $N(75,16)$.

- Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba waży więcej niż 83 kg?
- Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba waży nie więcej niż 79 kg?
- Jaka jest frakcja osób mających wagę pomiędzy 71 a 80 kg?
- Wyznaczyć wartość wagi której nie przekracza 80% badanej grupy.

80. **(d)** Zmienna losowa X ma rozkład dyskretny:

$$P(X = i) = \alpha \cdot i,$$

gdzie $\alpha \in R_+, i = 1, 2, \dots, 9$. Wyznaczyć stałą α i znaleźć rozkład zmiennej losowej Y , jeśli Y oznacza resztę z dzielenia X^2 przez 3.

81. X ma rozkład

$$P(X = k) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}, \quad k \in N.$$

Wyznaczyć rozkłady zmiennych losowych $U = \cos(\pi X)$ i $V = \cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)$.

82. X jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym na odcinku $[0,1]$. Znaleźć dystrybuantę i gęstość następujących zmiennych losowych

- $Y = aX + b$ gdzie $a, b \in R \wedge a \neq 0$;
- $Y = 2X^2 - 1$;
- $Y = -\ln(1 - X)$;
- **(d)** $Y = -\ln X$;
- $Y = X^k, k \in N$;

83. X ma rozkład wykładniczy ze współczynnikiem $\lambda > 0$. Znaleźć gęstość rozkładu:

- $Y = X^3$;
- $Y = 5X - 1$;
- **(d)** $Y = 3X + 2$;

84. X ma rozkład normalny $N(0,1)$. Jaki rozkład ma zmienna $Y = aX + b$ gdzie $a, b \in R, a > 0$?

85. Dana jest zmienna losowa $X \in N(0,1)$. Określamy zmienną losową $Y = X^2$. Wyznaczyć gęstość zmiennej losowej Y .

86. Zmienna losowa X ma rozkład geometryczny z parametrem p . Jaki rozkład ma zmienna losowa $Y = (-1)^X$?

87. X ma rozkład wykładniczy ze współczynnikiem $\lambda > 0$. Znaleźć gęstość rozkładu:

- $Y = \{X\}$, gdzie $\{X\} = X - [X]$ oznacza część ułamkową;
- $Y(\omega) = k^2$, gdy $k \leq X(\omega) < k + 1, k = 0, 1, 2, \dots$;

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

12.2010

88. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X o rozkładzie:

- a) Bernoulliego z parametrami: n, p ;
- b) geometryczny z parametrem p ;
- c) **(d)** Poissona z parametrem λ ;
- d) jednostajny na odcinku $[a, b]$;
- e) wykładniczy z parametrem λ ;
- f) normalny z parametrami: μ, σ ;

89. Znaleźć wartość oczekiwaną pola prostokąta, którego obwód równy jest 20, a jeden bok jest zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na odcinku $[1, 10]$.

90. Niech k - ustalona liczba naturalna, X zmienna losowa o rozkładzie określonym następująco: $P(X = 2^{\frac{i}{k}}) = 2^{-i}$. Wykazać, że $E(X^l)$ istnieje dla dowolnego $1 < l < k$.

91. Udowodnić $E(X) = 0 \Rightarrow E(|X|) \leq \frac{1}{2}(1 + D^2(X))$.

92. W urnie jest 8 białych i 2 czarne kule. Losujemy kule ze zwracaniem zwracania. X ilość wyciągniętych do momentu wyciągnięcia pierwszej kuli białej. Jaka jest wartość oczekiwana X ?

93. Obliczyć k -ty moment zmiennej losowej o rozkładzie wykładniczym.

94. Obliczyć k -ty moment zmiennej losowej o rozkładzie normalnym.

95. Niech $W_X = \{1, 2, \dots\}$, $E(X) < \infty$. Wtedy

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\{X \geq n\}).$$

96. Podać przykład zmiennej losowej X takiej, że $E(|X|) > E(|X|^2)$.

nierówności związane z momentami

19 grudnia 2010

97. Z klasycznej nierówności Czebyszewa ocenić prawdopodobieństwo, że zmienna losowa normalna (tzn. $N(m, \sigma)$) odchyli się od swojej wartości oczekiwanej o więcej niż
- cztery średnie odchylenia,
 - trzy średnie odchylenia.
98. Strzelamy 300 razy do tarczy z prawdopodobieństwem trafienia w jednym strzale wynoszącym $1/4$. Z nierówności Czebyszewa ocenić $P(|X - 75| < 30)$, gdzie X jest ilością trafień.
99. Zmienne losowe $X_i, i \in N$ są niezależne i mają jednakowe rozkłady $P(\{X_i = k\}) = 0,2$, gdzie $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Znaleźć prawdopodobieństwo, że zmienna $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ przyjmie wartość większą od 320.
100. Rzucamy 1000 razy kostką. Oszacować prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie równa co najmniej a) 3000; b) 5000.
101. Przy jakiej liczbie rzutów kostką prawdopodobieństwo tego, że częstość wypadnięcia szóstki różni się od $\frac{1}{6}$ nie mniej niż o $\frac{1}{36}$, jest mniejsze niż 0.1?
102. X ma rozkład jednostajny na odcinku $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$
- Oszacować z nierówności Czebyszewa $P(\{|X| \geq \frac{3}{2}\})$.
 - Obliczyć $P(\{|X| \geq \frac{3}{2}\})$ bezpośrednio.
103. Wykonujemy 100 rzutów symetryczną kostką. Korzystając z nierówności Czebyszewa oszacować przedział, w jaki z prawdopodobieństwem 0,85 wpada ilość otrzymanych szóstek.
104. Stosując nierówność Czebyszewa oszacowano, że prawdopodobieństwo tego, że liczba X orłów w serii rzutów symetryczną monetą będzie się różnić od swojej wartości oczekiwanej o więcej niż 25% tej wartości oczekiwanej nie jest większe niż $\frac{1}{160}$. Z ilu co najmniej rzutów składała się ta seria?

twierdzenie Moivre'a-Laplace'a; centralne twierdzenie graniczne

105. Rzucamy 180 razy kostką do gry. Obliczyć prawdopodobieństwo, że otrzymamy 32 razy szóstkę.
106. Korzystając z twierdzenia Moivre'a - Laplace'a oszacować prawdopodobieństwo, że w 720 rzutach kostką ilość szóstek będzie
- zawierać się pomiędzy 121 a 140
 - mniejsza niż 125
 - większa niż 110
107. Wykonujemy 1000 rzutów symetryczną kostką. Korzystając z twierdzenia Moivre'a - Laplace'a oszacować przedział, w jaki z prawdopodobieństwem 0,9 wpada ilość otrzymanych szóstek.
108. Wykonano n niezależnych doświadczeń. W wyniku każdego z nich może zajść zdarzenie A z prawdopodobieństwem $\frac{1}{3}$ lub zdarzenie A' z prawdopodobieństwem $\frac{2}{3}$. Niech X_n oznacza liczbę zajść zdarzenia A w n próbach. Oszacować prawdopodobieństwo

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n} - \frac{1}{3}\right| \leq 0,01\right)$$

- a) korzystając z nierówności Czebyszewa;
b) korzystając z twierdzenia Moivre'a-Laplace'a dla $n = 9000$.

Zinterpretować te oszacowania.

109. Przeprowadzono 60 jednakowych prób, w których mogło zajść zdarzenie A . Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenie w pojedynczej próbie wynosi 0,6. Obliczyć prawdopodobieństwo, że zdarzenie nie pojawi się w większości prób.

110. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia w jednym doświadczeniu wynosi 0,3. Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0,2 do 0,4?
111. Stosując twierdzenie Moivre'a-Laplace'a obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w 800 niezależnych próbach ilość sukcesów będzie większa niż 150, a mniejsza niż 250, jeśli prawdopodobieństwo sukcesu w każdej próbie jest równe $\frac{1}{4}$.
112. Na kampusie uniwersyteckim są dwie restauracje po 120 miejsc każda. Wiadomo, że codziennie 200 osób będzie chciało zjeść obiad a wybory restauracji dokonują losowo - powiedzmy, rzucając symetryczną monetą. Jaka jest szansa, że w którejś restauracji zabraknie miejsc? Ile miejsc należy przygotować w każdej restauracji, by powyższe prawdopodobieństwo było mniejsze od 0,001?