

# Teoria Miary i Całki

Bartosz Kwaśniewski

Faculty of Mathematics, University of Białystok

Wykład 4

**Twierdzenie o jednoznaczności miary  
( $\lambda$  i  $\pi$ -układy, miara Lebesgue'a)**

**Def.** Rodzinę zbiorów  $\mathcal{L} \subseteq 2^X$  nazywamy  $\lambda$ -układem na  $X$  jeśli

Ⓐ1  $X \in \mathcal{L}$  (zawiera całą przestrzeń)

Ⓐ2  $A \in \mathcal{L} \implies A' := X \setminus A \in \mathcal{L}$  (zamknięta na dopełnienia)

Ⓐ3  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}$  parami rozłączne  $\implies \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$  (zamknięta na rozłączne sumy ciągów)

**Uw1.** Każda  $\sigma$ -algebra jest  $\lambda$ -układem, ale nie na odwrót (istnienie  $\lambda$ -układu nie będącego  $\sigma$ -algebrą trudne – temat na pracę dyplomową)

**Uw2.**  $\lambda$ -układ zawsze zawiera  $\emptyset$  i jest zamknięty na skończone sumy rozłączne:  $A, B \in \mathcal{L}, A \cap B = \emptyset \implies A \sqcup B \in \mathcal{L}$

$\lambda$ -układ nazywa się też **układem Dynkina**.



$\sigma$ -algebra =  $\lambda$ -układ +  $\pi$ -układ

**Lem.**  $\lambda$ -układ  $\mathcal{L}$  jest  $\sigma$ -algebrą  $\iff \mathcal{L}$  jest  $\pi$ -układem, tzn. jest zamknięty na skończone przekroje:  $A, B \in \mathcal{L} \implies A \cap B \in \mathcal{L}$

**Dowód:** „ $\Leftarrow$ ” jasne bo każda  $\sigma$ -algebra jest  $\lambda$  i  $\pi$ -układem.  
 „ $\Rightarrow$ ” Niech  $\mathcal{L}$  będzie  $\lambda$  i  $\pi$ -układem. Wtedy  $\mathcal{L}$  jest zamknięta na różnice, bo  $A \setminus B = A \cap B'$ . Niech  $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{L}$ . Kładąc  $B_1 := A_1$ , i  $B_n := A_n \setminus B_{n-1}$  dla  $n > 1$ , dostajemy parami rozłączne  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}$  oraz  $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \bigsqcup_{n=1}^\infty B_n \in \mathcal{L}$  na mocy (L3). ■

**Def.**  $\lambda$ -układem generowanym przez rodzinę  $\mathcal{G} \subseteq 2^X$  nazywamy najmniejszy  $\lambda$ -układ  $\lambda(\mathcal{G})$  na  $X$  zawierający  $\mathcal{G}$



**Uw.** Z definicji wynika, że  $\lambda(\mathcal{G}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ , a równość  $\lambda(\mathcal{G}) = \sigma(\mathcal{G})$  zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy  $\lambda(\mathcal{G})$  jest  $\sigma$ -algebrą.



Sierpiński

**Tw.** (Lemat o  $\lambda$  i  $\pi$ -układach) Sierpiński 1928, Dynkin 1959

Jeśli rodzina  $\mathcal{G} \subseteq 2^X$  jest zamknięta na przekroje, to

$$\lambda(\mathcal{G}) = \sigma(\mathcal{G}).$$

Równoważnie,  $\lambda$ -układ generowany przez  $\pi$ -układ jest  $\pi$ -układem.

**Dowód:** Na mocy **Uw** oraz **Lem** wystarczy pokazać, że  $\lambda(\mathcal{G})$  jest  $\pi$ -układem! W tym celu użyjemy następujący **Fakt**

**Fakt.** Jeśli  $\mathcal{L}$  jest  $\lambda$ -układem na  $X$  oraz  $A \in \mathcal{L}$ , to  $\mathcal{L}_A := \{B \subseteq X : A \cap B \in \mathcal{L}\}$  też jest  $\lambda$ -układem na  $X$ .



**Krok 1.** Niech  $A \in \mathcal{G}$  oraz  $\lambda(\mathcal{G})_A = \{B \subseteq X : A \cap B \in \lambda(\mathcal{G})\}$ .

$\mathcal{G}$  jest  $\pi$ -układem  $\implies \forall_{B \in \mathcal{G}} A \cap B \in \mathcal{G} \subseteq \lambda(\mathcal{G})$

$$\implies \forall_{B \in \mathcal{G}} B \in \lambda(\mathcal{G})_A \iff \mathcal{G} \subseteq \lambda(\mathcal{G})_A$$

$$\stackrel{\text{Fakt}}{\iff} \lambda(\mathcal{G}) \subseteq \lambda(\mathcal{G})_A \iff \forall_{B \in \lambda(\mathcal{G})} A \cap B \in \lambda(\mathcal{G}).$$

Zatem pokazaliśmy, że  $\forall_{A \in \mathcal{G}} \forall_{B \in \lambda(\mathcal{G})} A \cap B \in \lambda(\mathcal{G})$ .

**Krok 2.** Niech  $B \in \lambda(\mathcal{G})$  oraz  $\lambda(\mathcal{G})_B = \{A \subseteq X : A \cap B \in \lambda(\mathcal{G})\}$ .

**Krok 1**  $\implies \forall_{A \in \mathcal{G}} A \cap B \in \lambda(\mathcal{G}) \iff \forall_{A \in \mathcal{G}} A \in \lambda(\mathcal{G})_B$

$$\iff \mathcal{G} \subseteq \lambda(\mathcal{G})_B \stackrel{\text{Fakt}}{\iff} \lambda(\mathcal{G}) \subseteq \lambda(\mathcal{G})_B$$

$$\iff \forall_{A \in \lambda(\mathcal{G})} A \cap B \in \lambda(\mathcal{G}).$$

Zatem  $\forall_{B \in \lambda(\mathcal{G})} \forall_{A \in \lambda(\mathcal{G})} A \cap B \in \lambda(\mathcal{G})$ , czyli  $\lambda(\mathcal{G})$  jest  $\pi$ -układem. ■

## Twierdzenie Dynkina (o jednoznaczności miary)

Niech  $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{G})$  będzie  $\sigma$ -algebrą generowaną przez  $\mathcal{G} \subseteq 2^X$  oraz

- 1  $\mathcal{G}$  jest zamknięta na przekroje,
- 2  $X_n \nearrow X$  dla pewnego  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{G}$ .

Dla dowolnych miar  $\mu$  i  $\nu$  na  $(X, \mathcal{F})$ , które pokrywają się na  $\mathcal{G}$  i przyjmują skończone wartości na zbiorach  $X_n$  z (2) mamy  $\mu = \nu$ .

**Dowód:** Dla każdego  $n \in \mathbb{N}$  rodzina

$$\mathcal{L}_n := \{A \in \mathcal{F} : \mu(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n)\}$$

jest  $\lambda$ -układem. Rzeczywiście,

$$(\Lambda 1) \quad \mu(X \cap X_n) = \mu(X_n) \stackrel{X_n \in \mathcal{G}}{=} \nu(X_n) = \nu(X \cap X_n) \implies X \in \mathcal{L}_n.$$

( $\Lambda 2$ ) Dla  $A \in \mathcal{L}_n$  mamy  $\mu(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n) < \infty$  i stąd

$$\begin{aligned} \mu(A' \cap X_n) &= \mu(X_n \setminus A) \stackrel{\text{różn}}{=} \mu(X_n) - \mu(A \cap X_n) = \nu(X_n) - \nu(A \cap X_n) \\ &\stackrel{\text{różn}}{=} \nu(X_n \setminus A) = \nu(A' \cap X_n). \end{aligned}$$

Zatem  $A' \in \mathcal{L}_n$ .

(Λ3) Dla parami rozłącznych  $\{A_m\}_{m=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}_n$  mamy

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} A_m \cap X_n\right) &\stackrel{\sigma\text{-add}}{=} \sum_{m=1}^{\infty} \mu(A_m \cap X_n) \stackrel{A_m \in \mathcal{L}_n}{=} \sum_{m=1}^{\infty} \nu(A_m \cap X_n) \\ &\stackrel{\sigma\text{-add}}{=} \nu\left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} A_m \cap X_n\right). \end{aligned}$$

Czyli  $\bigsqcup_{m=1}^{\infty} A_m \in \mathcal{L}_n$ . Zatem  $\mathcal{L}_n$  jest  $\lambda$ -układem.

Zauważmy teraz, że dla każdego  $n \in \mathbb{N}$  mamy

$$\mu|_{\mathcal{G}} = \nu|_{\mathcal{G}} \implies \mathcal{G} \subseteq \mathcal{L}_n \xrightarrow{\mathcal{L}_n \text{ } \lambda\text{-układ}} \lambda(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}_n.$$

Na mocy założenia (1) oraz **Lemat o  $\lambda$  i  $\pi$ -układach** mamy

$$\lambda(\mathcal{G}) = \sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{F}.$$

Zatem dla każdego  $A \in \mathcal{F}$  i  $n \in \mathbb{N}$  mamy  $\mu(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n)$ .

Stąd, że  $A \cap X_n \nearrow A$  i z ciągłości miary dostajemy

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A \cap X_n) = \nu(A). \quad \blacksquare$$

**Def.** Miara  $\mu$  na  $(X, \mathcal{F})$  jest  $\sigma$ -skończona jeśli istnieją parami rozłączne  $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$  takie, że  $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} Y_n = X$  oraz  $\mu(Y_n) < \infty$

**Uw.**  $\mu$  jest  $\sigma$ -skończona  $\iff$  istnieje ciąg  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$  taki, że  $X_n \nearrow X$  oraz  $\mu(X_n) < \infty$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .



**Wn1.** Miara Lebesgue'a jest jednoznacznie wyznaczona przez

$$\forall_{\substack{a_i, b_i \in \mathbb{Q} \\ a_i < b_i}} \lambda^n \left( [a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n) \right) = \prod_{i=1}^n |b_i - a_i|$$

**Dowód:** Rodzina

$$\mathcal{P}_w := \{[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n) : a_i, b_i \in \mathbb{Q}\}$$

jest zamknięta na przekroje i kładąc  $X_m = [-m, m)^n \in \mathcal{P}_w$  mamy  $X_m \nearrow \mathbb{R}^n$  oraz  $\lambda^n(X_m) = (2m)^n < \infty$ . Skoro  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\mathcal{P}_w)$ , to dla dowolnej miary  $\mu$  na  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  mamy

$$\mu|_{\mathcal{P}_w} = \lambda^n|_{\mathcal{P}_w} \implies \mu = \lambda^n. \quad \blacksquare$$

**Wn2.** Miara Lebesgue'a jest niezmiennicza ze względu na przesunięcia, tzn.  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \lambda^n(x + B) = \lambda^n(B)$ .

**Dowód:** Niech  $x \in \mathbb{R}^n$ . Dla  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  przesunięty zbiór  $x + B := \{x + y : y \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  jest borelowski. Wzór



$$\mu(B) := \lambda^n(x + B), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n),$$

definiuje miarę na  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . Dla  $P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \in \mathcal{P}_w$

$$\mu(P) = \lambda^n(x + P)$$


$$= \lambda^n([x_1 + a_1, x_1 + b_1] \times \cdots \times [x_n + a_n, x_n + b_n])$$

$$= \prod_{i=1}^n |(x_i + b_i) - (x_i + a_i)|$$

$$= \prod_{i=1}^n |b_i - a_i|$$

$$= \lambda^n(P).$$

Zatem  $\nu = \lambda^n$  na mocy **Wn1.** ■



**"Prostopadłościan jest ten sam"**



**Wn3.** Każda miara  $\mu$  na  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  niezmiennicza na przesunięcia z  $c := \mu([0, 1]^n) < \infty$ , jest krotnością miary Lebesgue'a:  $\mu = c \cdot \lambda^n$ .

**Dowód:** Niech  $P = [a_1, b_1) \times \cdots \times [a_n, b_n) \in \mathcal{P}_w$ . Niech  $M$  będzie wspólnym mianownikiem dla wszystkich ułamków  $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$ . Wtedy

$$P = \bigsqcup_{k=1}^K \left( x^{(k)} + \left[0, \frac{1}{M}\right]^n \right) \text{ dla pewnych } K \in \mathbb{N} \text{ oraz } x^{(k)} \in \mathbb{R}^n.$$

Z niezmienniczości na przesunięcia i addytywności  $\mu$  oraz  $\lambda^n$

$$\mu(P) = K\mu\left(\left[0, \frac{1}{M}\right]^n\right) \text{ oraz } \lambda^n(P) = K\lambda^n\left(\left[0, \frac{1}{M}\right]^n\right) = \frac{K}{M^n}.$$

Podobnie  $c := \mu([0, 1]^n) = M^n\mu\left(\left[0, \frac{1}{M}\right]^n\right)$ . Stąd

$$\frac{\mu(P)}{c} = \frac{K}{M^n} = \lambda^n(P).$$

Czyli  $\mu(P) = c \cdot \lambda^n(P)$  dla  $P \in \mathcal{P}_w$ . Zatem  $\mu = c \cdot \lambda^n$  na  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  na mocy **Wn1**. ■